

Informare referitoare la infecția cu virus West Nile

Specialiștii menționează că infecția cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătură de țânțar.

Cazurile de meningite/ meningo-encefalite cu virus West Nile depistate și înregistrate în România sunt sporadice, dar perioada iunie – noiembrie este considerată una cu risc crescut pentru infectarea cu acest virus.

Ministerul Sănătății recomandă autorităților administrației publice locale să intensifice măsurile de dezinsecție în localități pentru a preveni răspândirea infecției cu virus West Nile.

Circa 80% din persoanele infectate nu prezintă simptome, însă în cazul în care identificați semnele și simptomele de mai jos, specialiștii în sănătate publică ai Ministerului Sănătății vă recomandă să vă prezentați la cel mai apropiat cabinet medical:

- febră
- durere de cap intensă
- dureri musculare
- vărsături
- erupții cutanate

În cazurile severe, complicate, care afectează cel mai frecvent persoanele peste 60 de ani cu afecțiuni cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boală renală cronică), pot să apară și alte simptome:

- rigiditate a gâtului
- sensibilitate crescută la lumină
- convulsii
- frisoane
- oboseală cronică
- slăbiciune musculară.

Ministerul Sănătății recomandă populației mai multe măsuri de protecție:

- evitarea expunerii la țânțari, îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
- utilizarea substanțelor repelente de țânțari;
- montarea de plase la ferestrele locuințelor pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor;

- limitarea deplasărilor în zonele cu multă vegetație și umiditate ridicată (parcuri, păduri, ape stătătoare etc.)
- asigurarea măsurilor de desecare a bălților cu apă din jurul gospodăriilor;
- îndepărtarea recipientelor/obiectelor care favorizează acumularea apei și a gunoiului menajer.

Nu există vaccin sau tratament antiviral specific.